

◎ 訂正とお詫び ◎

本誌，第75巻第4号(2017年10月発行)の下記箇所に誤りがありました。訂正し，お詫び致します。

『血液内科』編集部

・ p. 420 図1 中央左

(誤) Ld*¹

推奨導入療法

新規薬剤を含む
2剤導入療法
BD, Ld*¹
(3~4コース)

(正) Ld

推奨導入療法

新規薬剤を含む
2剤導入療法
BD, Ld
(3~4コース)

・ p. 422 図2 中央右

(誤) Ld*¹

その他の治療法
従来の治療：
MP, CP, VAD, HDD
(plateau phaseまで継続*²)
新規薬剤レジメン：
Bd, Td*¹, Ld*¹
MPL*¹, MPTB*¹, CTd*¹

(正) Ld

その他の治療法
従来の治療：
MP, CP, VAD, HDD
(plateau phaseまで継続*²)
新規薬剤レジメン：
Bd, Td*¹, Ld
MPL*¹, MPTB*¹, CTd*¹

・ p. 422 本文 右段2行目~4行目

(誤) FIRST試験ではMPT療法とLd療法の比較が行われ，無増悪生存期間において明らかな差を認めない結果であった¹⁸⁾。

(正) FIRST試験ではMPT療法とLd療法の比較が行われ，Ld療法群はMPT療法群に比べ無増悪生存期間の有意な延長を認めた¹⁸⁾。