

リウマチ科, 第44巻第3号(2010年9月発行) 365頁~369頁「GM-CSFをターゲットとした関節リウマチ治療」の御論文中, 本文中p. 367内の図2, 3に誤りがありました。武内 徹先生および読者の諸先生には大変な御迷惑をおかけ致しまして, 深くお詫び申し上げます。

以下のように訂正させていただきます。

誤)




図2 関節炎発症前投与による抗GM-CSF治療の効果  
マウスII型コラーゲン誘発性関節炎モデルにおいて第0日目より第9日目まで毎日腹腔内に抗GM-CSF抗体を投与した。  
(文献<sup>17)</sup>より引用改変)




図3 関節炎発症後投与による抗GM-CSF治療の効果  
マウスII型コラーゲン誘発性関節炎モデルにおいて第21日目より第31日目まで隔日で腹腔内に抗GM-CSF抗体を投与した。a: 関節炎の重症度。\* コントロールに比べて $P=0.05$ , \*\* コントロールに比べて $P=0.01$ , b: 関節炎の累積発症率 (文献<sup>17)</sup>より引用改変)

正)




図2 関節炎発症前投与による抗GM-CSF治療の効果  
 マウスII型コラーゲン誘発性関節炎モデルにおいて第21日目より第31日目まで隔日で腹腔内に抗GM-CSF抗体を投与した。a: 関節炎の重症度。\* コントロールに比べて $P=0.05$ , \*\* コントロールに比べて $P=0.01$ , b: 関節炎の累積発症率 (文献<sup>17)</sup>より引用改変)




図3 関節炎発症後投与による抗GM-CSF治療の効果  
 マウスII型コラーゲン誘発性関節炎モデルにおいて第0日目より第9日目まで毎日腹腔内に抗GM-CSF抗体を投与した。(文献<sup>17)</sup>より引用改変)