

●訂正とお詫び●

本誌、第56巻5号(2016年11月発行)に著者により訂正がありました。下記の通り修正致します。

「リウマチ科」編集部

・ p. 449 表6(下記太枠内)

(誤) 表6 ESSDAI (EULAR Sjögren's Syndrome Disease Activity Index)

領域	重み (係数)	活動性	点数 (係数×活動性)
健康状態	3	無 0□ 低 1□ 中 2□	
リンパ節腫脹	4	無 0□ 低 1□ 中 2□ 高 3□	
腺症状	2	無 0□ 低 1□ 中 2□	
関節症状	2	無 0□ 低 1□ 中 2□ 高 3□	
皮膚症状	3	無 0□ 低 1□ 中 2□ 高 3□	
肺病変	5	無 0□ 低 1□ 中 2□ 高 3□	
腎病変	5	無 0□ 低 1□ 中 2□ 高 3□	
筋症状	6	無 0□ 低 1□ 中 2□ 高 3□	
末梢神経障害	5	無 0□ 低 1□ 中 2□ 高 3□	
中枢神経障害	5	無 0□ 低 1□ 中 2□ 高 3□	
血液障害	2	無 0□ 低 1□ 中 2□ 高 3□	
生物学的所見	1	無 0□ 低 1□ 中 2□	
ESSDAI (合計点数)		【ESSDAIによる疾患活動性評価】 5点未満:低疾患活動性 5～13点:中等度疾患活動性 14点以上:高疾患活動性	0点～123点

各領域の活動性の評価基準項目は省略している。

各領域の重み(係数)に活動性の点数をかけたものの総和がESSDAIの点数になる。

(計算例)健康状態が「低活動性」、血液障害が「中等度活動性」、残りは「活動性なし」の場合には、健康状態の重み(係数)3×1+血液障害の重み(係数)2×2=7点となる。
(文献¹²⁾¹⁴⁾より引用)

(正) 表6 ESSDAI (EULAR Sjögren's Syndrome Disease Activity Index)

領域	重み (係数)	活動性	点数 (係数×活動性)
健康状態	3	無 0□ 低 1□ 中 2□	
リンパ節腫脹	4	無 0□ 低 1□ 中 2□ 高 3□	
腺症状	2	無 0□ 低 1□ 中 2□	
関節症状	2	無 0□ 低 1□ 中 2□ 高 3□	
皮膚症状	3	無 0□ 低 1□ 中 2□ 高 3□	
肺病変	5	無 0□ 低 1□ 中 2□ 高 3□	
腎病変	5	無 0□ 低 1□ 中 2□ 高 3□	
筋症状	6	無 0□ 低 1□ 中 2□ 高 3□	
末梢神経障害	5	無 0□ 低 1□ 中 2□ 高 3□	
中枢神経障害	5	無 0□ 低 1□ 中 2□ 高 3□	
血液障害	2	無 0□ 低 1□ 中 2□ 高 3□	
生物学的所見	1	無 0□ 低 1□ 中 2□	
ESSDAI (合計点数)		【ESSDAIによる疾患活動性評価】 5点未満:低疾患活動性 5～13点:中等度疾患活動性 14点以上:高疾患活動性	0点～123点

各領域の活動性の評価基準項目は省略している。

各領域の重み(係数)に活動性の点数をかけたものの総和がESSDAIの点数になる。

(計算例)健康状態が「低活動性」、血液障害が「中等度活動性」、残りは「活動性なし」の場合には、健康状態の重み(係数)3×1+血液障害の重み(係数)2×2=7点となる。
(文献¹²⁾¹⁴⁾より引用)